

WYKAZ BADAŃ DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

LIST OF PRE-OPERATIVE LABORATORY TESTS

Pacjenci przed zabiegiem operacyjnym w znieczuleniu ogólnym w CM Aurismed muszą posiadać aktualne (nie starsze niż 3 tygodnie) wyniki badań:

To undergo a surgery under general anaesthesia in CM Aurismed, all patients have to submit current test results (done not earlier than 3 weeks before the surgery):

- 1. Grupa krwi w układzie ABO/Rh (oryginalny dokument) – badanie wykonane 2-krotnie.**
ABO/Rh blood type (original document) - this test has to be repeated twice.
- 2. EKG**
ECG
- 3. Morfologię krwi obwodowej**
Complete blood count
- 4. Na+ (w surowicy)**
Na+ (serum)
- 5. K+ (w surowicy)**
K+ (serum)
- 6. Glikemia na czczo (w surowicy)**
Blood sugar level on empty stomach (serum)
- 7. Kreatynina (w surowicy)**
Creatinine (serum)
- 8. Mocznik (w surowicy)**
Urea (serum)
- 9. Aminotransferaza alaninowa (ALT)**
Alanine transaminase (ALT)
- 10. Aminotransferaza asparaginowa (AST)**
Aspartate transaminase (AST)
- 11. Odczyn Biernackiego (OB, dla pacjentów zagranicznych - ESR).**
ESR
- 12. Białko C-reaktywne w surowicy**
C-reactive protein in serum
- 13. Czas protrombinowy (PT)**
Prothrombin time (PT)
- 14. Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)**
Activated partial thromboplastin time (APTT)
- 15. INR**
Blood clotting INR
- 16. Antygen HBs w surowicy**

HBs antigen in serum

17. **Przeciwciała anty-HCV**

Anti-HCV antibodies

18. **Inne.....**

Other.....

19. **Pacjenci nieszczepieni przeciw WZW – B, przed zabiegiem powinni się zaszczepić co najmniej dwukrotnie. Zabieg operacyjny może odbyć się co najmniej 2 tyg. po drugim szczepieniu.**

Patients not vaccinated against hepatitis B should be vaccinated at least twice. The surgery may be carried out 2 weeks after the second vaccination the earliest.

Pacjenci powyżej 40 roku życia powinni posiadać aktualne(nie starsze niż rok) badanie RTG klatki piersiowej.

Patients above 40 years of age need to have current chest x-ray (done not more than 1 year before the surgery).

Pacjenci palący powinni posiadać aktualne (nie starsze niż rok) badanie RTG klatki piersiowej- niezależnie od wieku.

Patients smoking cigarettes need to have current chest x-ray (done not earlier than 1 year before the surgery) - irrespective of their age.